

## MenaQ7 Forte - menaquinon 7 - (180 mcg) - 30

### gél

SP24090

Achetez ce produit sur <https://www.nutri4all.fr/menaq7-forte-vit-k2-menaquinon-7-180-mcg-30-vcaps>

La vitamine K2, sous forme de menaquinon-7, provient originellement du natto. Le natto est naturellement riche en vitamine K2 et en particulier le menaquinon-7. Cette forme naturelle de vitamine K2 est parfaitement assimilable, séjourne beaucoup plus longtemps dans l'organisme et exerce une action plus marquée que d'autres formes de vitamine K2.

## Description

### MenaQ7 vitamine K2 (menaquinon-7) contribue au maintiend'une ossature normale

La vitamine K2, sous forme de menaquinon-7, provient originellement du natto. Ce dernier est un produit typiquement japonais obtenu par la fermentation de la protéine de soja (par adjonction de *Bacillus subtilis*). Le natto est naturellement riche en vitamine K2 et en particulier le menaquinon-7. D'autres bactéries, comme *Bacillus licheniformis*, peuvent produire de grandes quantités de vitamine K2. Cette forme naturelle de vitamine K2 est parfaitement assimilable, séjourne beaucoup plus longtemps dans l'organisme et exerce une action plus marquée que d'autres formes de vitamine K2.

La vitamine K est importante pour la coagulation, mais des points de vue récents indiquent que la vitamine K semble être aussi importante que la vitamine D pour la conservation d'os solides. Cela est valable aussi bien pour les jeunes que les adultes.

En outre, la vitamine K, notamment la vitamine K2, possède diverses autres fonctions, qui sont importantes pour une physiologie normale.

### Usage recommandé

1-2 gélules par jour lors ou après un repas.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Un mode de vie sain et une alimentation variée et équilibrée sont importants. Un complément alimentaire ne remplace pas une alimentation variée. A conserver dans un endroit sec et frais et hors de portée des enfants.

### Interactions

Les laxatifs colestyramine et colesvelam réduisent l'assimilation des vitamines K et D. *À prendre avec un intervalle minimal de 2 heures.*  
Les antiépileptiques (phénobarbital, phénytoïne, primidon) réduisent le taux plasmatique des vitamines K et D (à l'exception de l'acide valproïque)

### Avertissements

Ne pas utiliser en association avec les anticoagulants (acénocoumarol, phenprocoumone ou warfarine). La vitamine K2 réduit l'action de ces médicaments.

## Composition

## Ingrédients

180 mcg Vitamine K2 menaquinon-7 (240 % AJR\*)

005 mcg Vitamine D3 cholécalciférol (200UI, 100% AJR\*)

\*AJR = apports journaliers recommandés

## Déclaration d'ingrédients

Cellulose, dioxyde de silicium.

<b>Catégorie:</b>	Vitamine K
<b>Forme:</b>	Capsule végétale
<b>Ingrédient:</b>	Vitamine D, Vitamine K2
<b>Ne contient pas de:</b>	Pas d'info